
molyhosan hófehér, kevesebb az idős, sötét vörösbarna, fénytelen és bársonyos tapintatú példány. Alakjuk általában szabálytalan, leginkább gömb- vagy tojás formájú, kevés nagy, de sekély bemélyedések következtében kissé dudoros. Felületükön kevés micéliumzsinór található, csersav szagúak, a gleba fekete, de világosan márványozott, kezdetben tömött (1. kép). A spórák mikroszkópos vizsgálatakor látható a nagy olajcsepp és néha csúcsszemölcs is.

Ami idekerülésük lehetőségét illeti, annak legvalószínűbb módja a spóráknak az egyik - közeli - kürtőn való bejutása a csapadékkal, vagy a légáramlat útján, s elképzelhető, hogy egyetlen példánytól származnak. Ugyanakkor fagyökerek is keresztülhatolnak és lejutnak idáig, így ezek szerepe sem zárható ki. A szóban forgó faj Szemere szerint (Föld alatti gombavilág, 175 pp, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1970) a Bazidiumos gombák osztályának Áltriflafélék családjába (Sclerodermataceae) tartozik. Jellemző rájuk, hogy a szarvasgombákhoz hasonlóan szintén a föld alatt élnek, ám éppen a kocsonyás álpöfetegek nemzetségének (Melanogaster) fajai - idehaza kettőről tudunk - nem fekszenek mélyen, csupán bokrok, fák körül az avarréteg alatt, de előkerült már kunyhó aljának talajfeszínén is. Nem számítanak ritkaságnak, s az év csaknem minden hónapjából van előfordulási adatuk.

Megfigyelésem jelentősége abban rejlik, hogy a fentebb ismertetett körülmények az apró kocsonyás álpöfeteg életfeltételeinek, az irodalom szerint egyáltalán nem felelnek meg. Sem a megfelelően magas hőmérséklet, sem a bőséges csapadék nem áll rendelkezésére, és a korhadó lombtakaró által szolgáltatott humusztartalom helyett a kopár sziklafal áll csupán rendelkezésre!



1. kép. Apró kocsonyás álpöfeteg /Melanogaster ambiguus/ telepe pince mennyezetén /fotó: Endes M./



2. kép Motacilla flava ssp. flava X ssp. feldegg hibrid hím. Komádi, Fűzfás, 1997. június 25. /fotó: Endes M./