RÖVID KÖZLEMÉNYEK

MACSKAHERE (PHLOMIS TUBEROSA) A TARDONAI-DOMBSÁGBAN. Az elmúlt években két területen sikerült megtalálni a fajt: a sajóbábonyi Asszony-völgyben kb. 55-60, a parasznyai Ökörítató nevű részen pedig 15 töves állományára bukkantunk.

Vizslán Tibor, Pingitzer Beáta

A SZIKI LÓROM (RUMEX PSEUDONATRONATUS, BORBÁS, 1880) ÚJ HAZAI ELŐFORDULÁSI ADATA. Florisztikával (is) foglalkozó természetbúváraink és kutatóink tollából igencsak ritkán olvasható adat kétszikű növényeink "hátsó feléről", az összefoglaló népies elnevezéssel csak "parajok"-nak mondott Chenopodiaceae, Amaranthaceae és Polygonaceae egyes fajairól. Pedig ezek között is található érdekes, terjedőben vagy éppen eltűnőben lévő, illetőleg ritka növény. Ez utóbbiak közé sorolható az enyhén szikes, és szikesedő Festucion pseudovinae rétek és szikes erdőtisztások elég nagytermetű, veszélyeztetett növénye, a sziki lórom.

1998. szeptember 29.-én az Élővíz Természetvédelmi Egyesület tagjaival az alattyáni Bereki-erdő és a nagykátai Hajta Nyik-rét nevű részén végeztünk Artemisia pontica és A. santonicum-al, illetőleg Peucedanum officinale-val kapcsolatos megfigyeléseket (ezek u.i. két, hazánkban endemikus alfajokkal képviselt lepke tápnövényei). Ekkor gyűjtöttünk be egy, a fodros lóromhoz hasonlatos, de attól mind levelében, mind terméssszerkezetében élesen különböző Rumex-et, amelyről otthoni határozás során (det.: Bánkúti Károly) kiderült, hogy a pseudonatronatus fajjal azonos. Külön figyelemre méltó, hogy előfordulását eddig csak Vésztőről (Fás-erdő) és Újszentmargitáról jelzik (hazai Vörös Könyvünkben a potenciálisan veszélyeztetett, de nem védett növények csoportjába

sorolják), ezen új előfordulási adat az eddigiektől lényegesen nyugatabbra van. Az adott terület a Praematricum-Crisicum határsávját képezi, míg a közvetlen termőhely igazi ürmös szikespusztának felel meg. A környező növényzet fő alkotóelemei az Artemisia santonicum, Achillea asplenifolium és A. collina, továbbá az Aster tripolium és A. linosyris voltak, utóbbiak feltűnő tömegben. További sajátosságnak nevezhető ugyanott a Peucedanum alsaticum, Serratula tinctoria, Molinia hungarica, Salsola kali sokasága.

Buschmann Ferenc

ADATOK AZ ÁRTÉRI JAPÁNKESERŰFŰ (REYNOUTRIA JAPONICA) BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELTERJEDÉSÉHEZ. Ez a Japánból származó évelő, eredetileg kerti dísznövényként kezdte hódítását. Mára a megye legtöbb részén kisebb-nagyobb állományai alakultak ki, főleg vízparton, árkokban vagy egyéb vizes élőhelyeken és környékén található. Ezen élőhelyekből említenék néhányat példaként: Kazincbarcikán a város belterületén és a Borsodchem Rt. víztisztító telepén, valamint a Sajó környékén található nagy tömegben. Miskolcon szintén a belterületen, főleg a Pece- és Szinva-patak környékén gyakori. Sajószentpéteren, Radostyánban, Szirmabesenyőn az árkokban figyelhető meg kisebb-nagyobb állománya. A vizes élőhelyeken a közeljövőben bárhol számíthatunk megjelenésére.

Vizslán Tibor

ADATOK HÁROM SYMPETRUM (ODONATA) FAJ ELŐFORDULÁSÁHOZ ÉS MENNYISÉGI ADATAIHOZ 1997-BEN. A három faj közül a legjelentősebb növekedés az útszéli vagy sárgaszárnyú szitakötő (Sympetrum flaveolum) esetében zajlott. A több éve kutatott Varbói-tározóról eddig nem volt