sorolják), ezen új előfordulási adat az eddigiektől lényegesen nyugatabbra van. Az adott terület a Praematricum-Crisicum határsávját képezi, míg a közvetlen termőhely igazi ürmös szikespusztának felel meg. A környező növényzet fő alkotóelemei az Artemisia santonicum, Achillea asplenifolium és A. collina, továbbá az Aster tripolium és A. linosyris voltak, utóbbiak feltűnő tömegben. További sajátosságnak nevezhető ugyanott a Peucedanum alsaticum, Serratula tinctoria, Molinia hungarica, Salsola kali sokasága.

Buschmann Ferenc

ADATOK AZ ÁRTÉRI JAPÁNKESERŰFŰ (REYNOUTRIA JAPONICA) BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELTERJEDÉSÉHEZ. Ez a Japánból származó évelő, eredetileg kerti dísznövényként kezdte hódítását. Mára a megye legtöbb részén kisebb-nagyobb állományai alakultak ki, főleg vízparton, árkokban vagy egyéb vizes élőhelyeken és környékén található. Ezen élőhelyekből említenék néhányat példaként: Kazincbarcikán a város belterületén és a Borsodchem Rt. víztisztító telepén, valamint a Sajó környékén található nagy tömegben. Miskolcon szintén a belterületen, főleg a Pece- és Szinva-patak környékén gyakori. Sajószentpéteren, Radostyánban, Szirmabesenyőn az árkokban figyelhető meg kisebb-nagyobb állománya. A vizes élőhelyeken a közeljövőben bárhol számíthatunk megjelenésére.

Vizslán Tibor

ADATOK HÁROM SYMPETRUM (ODONATA) FAJ ELŐFORDULÁSÁHOZ ÉS MENNYISÉGI ADATAIHOZ 1997-BEN. A három faj közül a legjelentősebb növekedés az útszéli vagy sárgaszárnyú szitakötő (Sympetrum flaveolum) esetében zajlott. A több éve kutatott Varbói-tározóról eddig nem volt

előfordulási adata. Az idén augusztus második felétől kezdve, szeptember elejéig tömegesnek mondható volt a tározó mellett, ahol párzó és peterakó egyedeket nagy számban lehetett megfigyelni. Miskolcon, Kazincbarcikán, Gagybátorban is sikerült megtalálni a fajt a megyében, a megyén kívűl Ócsán (Pest megye), a madárvárta területén szeptember középső részében gyakori faj volt. A másik két faj a szalagos vagy barnacsíkos szitakötő (Sympetrum pedemontanum) és a fekete szitakötő (Sympetrum danae) volt. Mindkét fajt Varbón a tározón és Miskolcon a Szinva-patak mellett sikerült megtalálnunk augusztus második felében, általában csak egy-egy példányban.

Vizslán Tibor, Pingitzer Beáta

A SZARVASBOGÁR (LUCANUS CERVUS) ÚJABB LELŐHELYE A HORTOBÁGYON. A faj irodalmi adatok szerint az egyeki Ohati-erdő és az újszentmargitai Tilos-erdő területéről ismert. 2010. júliusában a püspökladányi Farkasszíget szikkísérleti erdejének idős tölgyesében több példányát észleltem.

Endes Mihály

ADATOK AZ ASSZONY-VÖLGY LEPKEFAUNÁJÁHOZ /LEPIDOPTERA/. A sajóbábonyi Asszony-völgyben 1990-96 közötti időszakban gyűjtőt Lepidoptera adatainkat adjuk közre. A fajok felsorolásánál látszik, gyűjtéseink csak alkalmi jellegűek voltak, a teljesség igénye nélkül és csak néhány családra terjednek ki. A tudományos név után az előfordulás relatív gyakoriságára utalunk, az alábbiak szerint: igen gyakori – I., gyakori – II., mérsékelten gyakori – III., ritka – IV., szórványos – V.

Pávaszemes szövők – SATURNIIDAE

Kis pávaszem /Eudia pavonia/ - V.