előfordulási adata. Az idén augusztus második felétől kezdve, szeptember elejéig tömegesnek mondható volt a tározó mellett, ahol párzó és peterakó egyedeket nagy számban lehetett megfigyelni. Miskolcon, Kazincbarcikán, Gagybátorban is sikerült megtalálni a fajt a megyében, a megyén kívűl Ócsán (Pest megye), a madárvárta területén szeptember középső részében gyakori faj volt. A másik két faj a szalagos vagy barnacsíkos szitakötő (Sympetrum pedemontanum) és a fekete szitakötő (Sympetrum danae) volt. Mindkét fajt Varbón a tározón és Miskolcon a Szinva-patak mellett sikerült megtalálnunk augusztus második felében, általában csak egy-egy példányban.

Vizslán Tibor, Pingitzer Beáta

A SZARVASBOGÁR (LUCANUS CERVUS) ÚJABB LELŐHELYE A HORTOBÁGYON. A faj irodalmi adatok szerint az egyeki Ohati-erdő és az újszentmargitai Tilos-erdő területéről ismert. 2010. júliusában a püspökladányi Farkasszíget szikkísérleti erdejének idős tölgyesében több példányát észleltem.

Endes Mihály

ADATOK AZ ASSZONY-VÖLGY LEPKEFAUNÁJÁHOZ /LEPIDOPTERA/. A sajóbábonyi Asszony-völgyben 1990-96 közötti időszakban gyűjtőt Lepidoptera adatainkat adjuk közre. A fajok felsorolásánál látszik, gyűjtéseink csak alkalmi jellegűek voltak, a teljesség igénye nélkül és csak néhány családra terjednek ki. A tudományos név után az előfordulás relatív gyakoriságára utalunk, az alábbiak szerint: igen gyakori – I., gyakori – II., mérsékelten gyakori – III., ritka – IV., szórványos – V.

Pávaszemes szövők – SATURNIIDAE

Kis pávaszem /Eudia pavonia/ - V.

Szenderek – SPHINGIDAE

Szulákszender /Agrius convolvuli/ - III.
Fagyalszender /Sphinx ligustri/ - V.
Esti pávaszem /Smerinthus ocellatus/ - IV.
Galajszender /Hyles galii / - V.
Nyárfaszender /Laothoe populi/ - IV.

Busalepkék – HESPERIDAE

Cigány busalepke /Erynnis tages/ - I.
Mályva busalepke /Pyrgus malvae/ - II.
Erdei busalepke /Ochlodes venatum/ - II.
Vesszős busalepke /Hesperia comma/ - III.

Pillangók – PAPILIONIDAE

Fecskefarkú lepke /Papilio machaon/ - IV.
Kardos lepke /Iphiclides podalirius/ - III.

Fehérlepkék – PIERIDAE

Mustárlepke /Leptidea sinapis/ - III.
Galagonyalepke /Aporia crataegi/ - II.
Káposztalepke /Pieris brassicae/ - III.
Répalepke /Pieris rapae/ - IV.
Repcelepke /Pieris napi/ - II.
Citromlepke /Gonepteryx rhamni/ - II.
Hajnalpírlepke /Anthocharis cardamines/ - III.
Kénes lepke /Colias hyale/ - III.

Tarkalepkék – NYMPHALIDAE

Kis gyöngyházlepke /Clossiana dia/ - V.
Közönséges gyöngyházlepke /Issoria latonia/ - I.

Közönséges tarkalepke /Mellicta athalia/ - V.
Atalanta lepke /Vanessa atalanta/ - III.
Bogáncslepke /Vanessa cardui/ - III.
Nappali pávaszem /Inachis io/ - I.
Nagy rókalepke /Nymphalis polychloros/ - V.
Gyászlepke /Nymphalis antiopa/ - IV.
Kis rókalepke /Aglais urticae/ - II.
C-betüs lepke /Polygonia c-album/ - IV.
Lonclepke /Limenitis camilla/ - V.
Nagy színjátszólepke /Apatura iris/ - V.

Szemeslepkék – SATYRIDAE

Erdei szemeslepke /Pararge aegeriae/ - III.
Sakktáblalepke /Melanargia galathea/ - II.
Fehéröves szemeslepke /Brinthesia circe / - IV.
Közönséges szemeslepke /Arethusana arethusa/ - II.
Kis szénalepke /Coenonympha pamphilus/ - III.
Közönséges ökörszemlepke /Aphantopus hyperanthus/ - II.

Vizslán Tibor, Pingitzer Beáta

ROVARTANI ADATOK DERECSKE KÖRNYÉKÉRŐL. 2009. évben a Berettyó-Kálló köze kistáj Derecskétől keletre eső részében az alábbi részben védett, illetőleg Vörös Könyves fajokat észleltük: szarvasbogár (Lucanus cervus) – a kb. 5 hektáros magasártéri tölgy-kőris-szil keményfaliget (Fraxino pannonicae-Ulmetum) Tépei-erdőben gyakori. Kis színjátszólepke (Apatura ilia) egy példánya a Derecskei-Kálló ér partján. Délvidéki poszméh (Bombus argillaceus), a Nagy-nyomás degradált löszgyepében szennyes bükkönyön (Vicia grandiflora) egy hím példány táplálkozott. Minthogy hivatalos megítélés szerint „a kipusztulás közvetlen veszélyébe került” fajról van szó, amely az