SZOKATLAN TOLLAZATÚ NAGY GODA (LIMOSA LIMOSA). 1994. május 30-án a kömlői ülepítőn egyéb partimadarak társaságában két nagy goda táplálkozott. Már távcső használata nélkül is feltűnt, hogy az egyikük szokatlanul világos színezetű. Takarásból, 8-10 méterről sikerült jobban megfigyelnem: a szárnyfedők és a háti oldal egyöntetű fakó barnásszürkék voltak, a belső fedőtollakon fehéres szegéssel. Hasoldala fehér, a begy fakószürkés színezetet mutatott. A szokatlanul világos tollazatú nagy godát a terület szinte naponkénti ellenőrzése mellett sem észleltem újabb alkalommal.

Ambrus Béla

AZ ERDEI CANKÓ (TRINGA OCHROPUS) ESETLEGES KÖLTÉSE A SAJÓ MENTÉN. 1993. július 02.-án Sajóecsegen, a folyó szigetszerűen kiemelkedő kavicsos részén jártam. Ez a terület tavasszal általában víz alatt van, de a nyár derekára vízmentes lesz, növényzet csak alkalmilag telepszik meg rajta. Itt jelent meg egy erdei cankó előttem pár méterre, vészjelszerű hangokat hallatva, félig kiterjesztett szárnnyal szaladgált. Ismerve a faj eddig leírt fészkelő területeit, nem látszott valószínűnek, hogy fiókát találok, de megpróbáltam átjárni a területet, sajnos sikertelenül.

Vizslán Tibor

VÉKONYCSŐRŰ VÍZTAPOSÓ (PHALAROPUS LOBATUS) MEGFIGYELÉSE TORNYOSNÉMETINÉL. 1997. szeptember 2-án Ézsöl Tibor tagtársammal végeztünk madártani megfigyeléseket a Tornyosnémeti melletti területen. A Hernád-folyó jobb partján található tavon figyeltünk meg 2 példányt. A

madarak a leeresztett tó sekély vizének szélében jellegzetes, folyamatosan forgó mozgással táplálkoztak.

Serfőző József

ÖRVÖS GALAMB (COLUMBA PALUMBUS) KÖLTÉSE A DE TEK BOTANIKUS KERTJÉBEN. 1998. március 18-án figyeltem meg az első örvös galambot a botanikus kert területén. Április 1-től rendszeresen mozgott 2-3 példánya a tó körül, illetve a kert déli részén lévő nyitvatermő gyűjtemény területén. A faház melletti akácosban is búgott több alkalommal 1 példánya. A fészket április 6-án találtuk meg egy hallgatótársammal, Kliegl Diánával egy virginiai borókán (Thuja virginiana)kb. 5 m magasan, a törzstől 20-30 cm-re. A fészek a borókás északi szélén, közvetlenül a sétány mellett épült. Állandó forgalom volt a fészektől néhány méternyire, ám ez sem kotláskor, sem fiókaneveléskor láthatóan nem zavarta az egyébként óvatos madarak költését. A költés sikeres volt, két fiókát repített a pár. Több párról, illetve költésről nem tudok.

Két korábbi fészkelőállomány-felmérés ismert a kert területéről, melyeket Bozsko Szvetlana publikált 1969-ben, illetve 1979-80-ban (ez utóbbit Papp Lászlóval együtt), de egyikben sem említik a fajt sem mint fészkelőt, sem mint a kertbe táplálkozni bejárót. Így új fajjal bővült a kert költő madarainak száma.

Serfőző József

FÜLESKUVIK (OTUS SCOPS) MEGTELEPEDÉSE A HEVESI-SÍKON. A füleskuvik a Hevesi-síkkal szomszédos tájakon (Borsodi-Mezőség, Hortobágy) már évekkel ezelőtt megjelent mint költőfaj, s ebből fakadóan várható volt a dél-hevesi megtelepedése is. 1999. július 2-án a kömlői Kocsordoson, amely fasorokkal, ligetekkel tarkított és szántókkal körbezárt kb. 50 hektáros magasfűvű rét, szalakóták számára kihelyezett D