a park területén, amint a fák ágain pihentek. Így hamar kiderült, hogy a fiókák négyen vannak. A faj korai költésére a szakirodalom több példát is említ, de Debrecenben ez az általunk ismert első ilyen esemény. Március 5-én reggel két fióka őlőfája alól 1 friss köpetet, s 1 korai denevér (Nyctalus noctula) friss állapotú tetemét gyűjtöttük. A köpetben egy fekete rigó (Turdus merula) maradványait találtuk. További megfigyelések során a madarak őlőfája alól a balkáni gerle (Streptopelia decaocto) 2 példányának toll- és csontmaradványait találtuk.

Bán Miklós, Serfőző József

URÁLI BAGOLY (STRIX URALENSIS) ELŐFORDULÁSA DEBRECEN-JÓZSÁN. 2008. november 27-én kora reggel a józsai Tesco áruház mögött húzódó, a Tócó-patak partján elterülő erdősávban, zömmel fehérfüzes és vegyes nyárassal kevert állományban egy nagyméretű bagolyra lettem figyelmes, amely tőlem kb. 60-80 m-re a fák között lebbent át egyik vastag ágról a másikra. Első benyomásra a nagyságát látva uhunak véltem. Távcsővel néhány percen belül ismét a helyszínen voltam, sikerült megtalálnom és azonosítani: uráli bagoly volt. A madár végül tőlem megijedve kirepült az erdősávból és a házak fölött a nagylegelő irányában eltűnt. Másnap reggel felfigyeltem, hogy az erdősáv egyik sarkából két dolmányos varjú folyamatosan riaszt. Odaérve megláttam az uráli baglyot, amint egy fehérfűz kihajló ágán üldögél, felette a két dolmányos varjúval, amelyek "dühödten szidalmazták". Fél óra múlva eltűntek. Néhány óra eltelte után ismét a bagoly keresésére indultam, és az erdősáv északkeleti részében egy derékba tört nyárfa törzséhez közel behúzódva, egy vastag oldalág mellett ülve találtam meg. Körülette hangoskodott négy dolmányos varjú és három vetési varjú is. Így egyesült erővel estek neki. Az elkövetkező napoktól kezdve már hiába kerestem, nem találtam a környéken. Meglepő, hogy ilyen urbánus környezetben is megjelenhet ez a nagytestű bagoly. Az erdősáv viszont jó táplálkozó terület, gyakori a

pirókegér, mezei pocok, erdei cickány, stb., valószínű, hogy ez is arra késztette, hogy itt időzzön néhány napot.

Dudás Miklós

SARLÓSFECSKÉK (APUS APUS) KÖLTÉSE MISKOLCON. Miskolcon 1997-ben két helyen, a Vörösmarty lakótelepen és a Győri kapuban figyeltük meg 5 pár költését a tízemeletes panelházakon.

Vizslán Tibor, Pingitzer Beáta

GYURGYALAG (MEROPS APIASTER) FÉSZKELŐTELEP DEBRECEN NYUGATI SZÉLÉN. A Domokos Márton-kert elnevezésű külterület északi felén, több évtizede felhagyott „homokbánya” kb. 300 méter hosszúságú, 8 méter átlagmagasságú löszfalaiban mintegy tíz pár etette fiókáit 2009. július 5-én. Költőüregeik száma 25-re tehető, amelyek egy részét házi verebek (Passer domesticus) foglalták el. A bányaudvar szintjén kukorica, a felsőn gabona termelése folyik. A helyi flóra, amelyet akácsor és néhány nyárfa tarkít, vadvirágokban gazdag, rajta szép számú és fajú rovar (közöttük hártyásszárnyúak) táplálkozik, amely terített asztalt kínál madarainknak. Hiteles adatok szerint ez a telep „régóta” ismert, magam tizenegy éve tudok létezéséről. Érdekesség, hogy az egykori téglagyár légvonalban csupán néhány száz méterre eső agyagbányáiban az 1960-70-es években nem észleltem fészkelését. A nehezen megtalálható és megközelíthető telep védelmi javaslatát a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz eljuttattam.

Endes Mihály