uralkodó időjárási viszonyok függvényében – általában április második felére, végére volt jellemző. 1997-ben csak május 3-án észleltük az első egyedeket a területen. A fentebb említett pár – amely már jóval korábban megérkezhetett – az adott terület nehéz megközelíthetőségéből adódó ritkább látogatottság miatt elkerülhette a figyelmünket.

Ambrus Béla

MESTERSÉGES ODÚBAN KÖLTŐ VÖRÖSBEGY (ERITHACUS RUBECULA) A DE TEK BOTANIKUS KERTJÉBEN. A DE TEK Botanikus Kertjének odútelepét 1996 óta kezelem. 1999. VI. 11-én odúellenőrzés során éppen kelésben lévő ötös (2 frissen kelt fióka + 3 tojás) fészekalját találtam a vörösbegynek az egyik műodúban. Az odú a gyöngyvirágos-tölgyesben (Convallario-Quercetum) 2,2 méter magasan lett kihelyezve D-i tájolással, egy fiatal cseresznyefára. A korábbi években széncinege (Parus major) költött benne, de a tél folyamán a harkályok eredeti nyílását erősen kitágították. A fészek csészéje nem az odú közepén, hanem az egyik sarkában épült. A fészek anyaga főként növényi szálak, gyökerek és moha volt. A költést június 21-én ellenőriztem, de sajnos a fiókákat elpusztulva találtam. A két, 11-én kelt fiókán kívül több nem kelt ki, s ezek 8-9 naposak lehettek amikor elpusztultak. A három tojást megvizsgáltam, s az egyikben közvetlen kelés előtt álló fióka, a következőben pedig pár napos korban befulladt embrió volt. A harmadikban a szik a héjhoz tapadt, benne az embrió nem indult fejlődésnek. A költés valószínűleg a szülő(k) pusztulása miatt lehetett sikertelen. A faj műodúban költését már hazánkban is többen leírták, de a kertben ez az első általam ismert, sajnos sikertelen eredményű eset.

Serfőző József