Szőlőrigó megfigyelések a Botanikus kertben 1997-98. telén, havonkénti bontásban

Hó	Megfigyelőnap	Szőlőrigó észlelési nap	Észlelt példányszám
október	9	2	2+5
november	4	2	7+2
december	1	1	5
február	16	9	4+3+1+2+4+3 +1+7+2
március	12	1	2

Ezúton szeretném megköszönni a Botanikus kert vezetőinek, Szabó Máriának és Papp Lászlónak, valamint a DE TEK Viselkedésökológiai Kutatócsoportnak a segítségét munkám sikeres elvégzéséhez.

Serfőző József

RÉTI TÜCSÖKMADÁR (LOCUSTELLA NAEVIA) A MONOSTORI-ERDŐBEN. 1998. 05. 04-én felhős időben végeztem állományfelmérést Bodaszőlőtől D-re. Leginkább az erdei pacsirta (Lullula arborea) elterjedési gyakoriságát vizsgáltam – ez évben a debreceni klinikáktól Bodaszőlőig terjedő erdős és gyümölcsös élőhelyeken 6 revír lett feltérképezve –, így jutottam a fenti település közelében elterülő előző évi tarvágás területére. Az akáctuskókból előtörő 1,5-2 m magas sarjak között néhol 1 m magasságot is meghaladó gyomtársulás alakult ki. A több mint fél órája csendesen szemerkélő esőben ezen az élőhelyen hallottam meg az erőteljesen „éneklő” réti tücsökmadarat. A vonuló egyed legalább negyedóráig – ottlétem alatt – kitartóan hallatta hangját. Az utóbbi időszakban bekövetkezett fészkelőterület expanzió – cserjés vegetációban kialakult revírek – talán egyes egyedek

vonulási szokásaira is rányomta bélyegét, ezért találkozhattam a fajjal a számomra szokatlan élőhelyen.

Veszelinov Ottó

BÚBOS CINEGE (PARUS CRISTATUS) DEBRECEN MELLETT. Halápon, tölgyesben, 1998. december 13-án egy példányt láttam vegyes cinegecsapatban (szerkesztői megjegyzés: az ismereteink szerint a hegy- és dombvidéki fenyvesek ritka fészkelőjének, egyben állandó madarának itteni előfordulása különleges jelenségnek számít).

Dudás Miklós

ADATOK A FENYVESCINEGE (PARUS ATER) INVÁZIÓSZERŰ MOZGALMÁHOZ. A faj a Hevesi-síkon rendkívül ritka vendég, az 1996-os szokatlan példányszámú megfigyeléseit megelőzően a kistájról évekre visszatekintve csak egy észlelési adattal rendelkeztünk. Az adott évben viszont már az első megfigyelési napon 9 példányt észleltem. Szeptember 15-én a kömlői Balog-halom-dűlőn 5, Hevesvezekény belterületén 4 egyed intenzív mozgását és táplálkozását kísérhettem figyelemmel. Az igazi tömeges megjelenését Eger déli városrészében tapasztaltam. Szeptember közepétől januárig kertekben, parkokban rendszeresen mozogtak néhány példányos táplálkozó csapatai – elsősorban tujákon –, de nem volt ritka a 8-10 egyedből összetevődő laza csoportok észlelése sem. 1997 őszén a várakozások ellenére sem ismétlődött meg a faj előző esztendei inváziószerű megjelenése a Hevesi-síkon, és a megye egyéb területein.

Ambrus Béla