megtaláltam a fészket, majd a közelben táplálék után kutató és etető öreg madarakat. Július első napjaiban Lovasi Istvánnak még sikerült a madarakat megfigyelnie.

Ambrus Béla

DOLMÁNYOS VARJÚ (CORVUS CORNIX) TÁPLÁLKOZÁSA „MOSÓMEDVE-TECHNIKÁVAL". Debrecenben, a Nagyerdei Kultúrpark „Békás-tavánál" 2010 nyarán figyeltem meg néhány egyéves példányt (korukat Juhász Lajos gyűrűzőmunkája alapján sikerült tisztázni). A madarak a járókelők által eldobált száraz pékárut, így kenyér- és perecdarabokat, kiflivégeket szedték fel, majd gyalogosan a tó szélére vitték és a vízbe engedték. A lebegő darabokat a közelben sétálók szeme láttára csőrükkel igazgatták, mártogatták, majd miután azok kellően megpuhultak, elfogyasztották.

Endes Mihály

ALBÍNÓ HÁZI VERÉB (PASSER DOMESTICUS) EGERBEN. 1999. július 28-án Egerben a Faiskola úton egy 30 példányos házi veréb csapatban egy albínó egyedet figyeltem meg. A madár tollazata szinte teljesen egyöntetű fehér volt. A következő hetekben több alkalommal észleltem a csapattal mozgó fehér madarat. Az utolsó megfigyelés augusztus 13-án történt.

Ambrus Béla

TENGELIC (CARDUELIS CARDUELIS) KÉSŐI FIÓKANEVELÉSE. A fajnál az esetenkénti harmadszori, júliusi költésnél a fiókák etetése áthúzódhat augusztus elejére. A kömlői Háláska egyik fasorának kőrisén ennél sokkal későbbi időpontban 1999. augusztus 24-én kirepülés előtt álló fiókákat etető tengelicet

figyeltem meg. A következő napokban a 4 fióka elhagyta a fészket.

Ambrus Béla

ÁTNYARALÓ CSÍZ (CARDUELIS SPINUS) AZ ALFÖLD KÖZEPÉN. 2002. májusának utolsó napjaiban dr. Harka Ödön jelezte a Szolnokhoz közeli Zagyvarékasról, hogy családi házuk kertjében naponta visszatérő vendég egy csíz, immáron két hét óta. Kétkedve fogadtam a hírt, mert a fajjal kizárólag téli vendégként találkoztam az Alföldön, ezért inkább egy sötét színezetű csicsörkére gyanakodtam. Júniusban azonban magam is meggyőződtem a meghatározás helyességéről. Néhány méteres távolságból figyelhettem meg a lucfenyő ágai közt bujkáló, majd alatta csipegető, végül az itatóban hosszan fürdőző madarat. Fekete homloka és torka, valamint a szélső farktollain világító sárga foltok félreérthetetlenül bizonyították, hogy egy hím példánnyal állunk szemben. A mindig magánosan járó madár kitartónak bizonyult, augusztus közepéig rendszeres látogatója maradt a kertnek. Gyakori fürdőzése és a nyár folyamán egyre gazdagodó éneke sok kellemes percet szerzett, túl azon, hogy a faj átnyaralása az Alföld közepén észlelésként is figyelmet érdemlő.

Harka Ákos

ADATOK A KERESZTCSŐRŰ (LOXIA CURVIROSTRA) MAGYARORSZÁGI ELTERJEDÉSÉHEZ. A holarktikus elterjedésű, fenyőövhöz kötődő madárnak az utóbbi években egyre szaporodnak az adatai, előfordulási helyei mind hegyvidéken, mind az alföldi területeken. Bőséges fenyőtoboz termés esetén, mint 1994, valamint 2007-2008-ban inváziószerűen jelent meg. A csapatok többnyire 15-20 tagúak, akár több hetet is eltölthetnek az adott területen. Költését eddig Sopron és Kőszeg területén és az Északi-középhegység területén észlelték