parkokban, kertekben, útszéleken is, ahol a táplálékot adó fenyőfélék gazdag toboztermése elérhető számukra.

Szabó Sándor

HÓSÁRMÁNY (PLECTROPHENAX NIVALIS) ELŐFORDULÁSA TISZALÚCNÁL. 1997. december 6-án Hernádnémeti és Tiszalúc közötti területen madarásztam, amikor az egyik földút melletti néhány négyzetméteres gyepfoltról felrebbentettem a hósármány 14 pld-os csapatát. Két kört repültek a terület fölött, majd déli irányba távoztak. A terület körös-körül szántóföld, kb. 1 km-re a megfigyelés helyszínétől északra mintegy 100 ha lucernás található.

Serfőző József

ADATOK A DEBRECENI EGYETEM TEK BOTANIKUS KERTJÉNEK MADÁRVILÁGÁHOZ. Tavaszi madárvonulás. 1996. áprilisában az alábbi, a kertben egyébként ritkábban megfigyelhető madárfajokkal találkoztam: 11-én a kertben található tó partjára 4 pld. erdei szürkebegy (Prunella modularis) szállt le inni. 12-étől 18-áig 1 pld. öreg tollazatú, hím kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) tartózkodott a tó körül. A korláton és a fák ágain ült lesben, innen vadászott a repkedő rovarokra. 17-én a tó fölé hajló szomorúfűz gallyai között 1 pld. tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus) keresgélt.

Szőlőrigó (Turdus iliacus) megfigyelések 1995-96-ban. 1995. november 8. 1 pld., feketerigók (Turdus merula) társaságában tuján (Thuja occidentalis) táplálkozott, annak tobozkáival. November 10. 2 pld. feketerigók, fenyőrigók (Turdus pilaris) és léprigók (Turdus viscivorus) között a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) terméseit fogyasztotta, november 15-én 1 pld. a tóból ivott. 1996. október 16. 1 pld. a tó partjára szállt le, de egy járókelő miatt elrepült. Október 20. 1 pld. feketerigók