ORRSZARVÚ BOGÁR (*ORYCTES NASICORNIS HOLDHAUSI*) NAGY AGRÁRTERÜLET FASORÁBAN. A Siteri-laposa elnevezésű vidéken (Hajdú-Bihar megye, Hajdúböszörmény ÉNY), több km távolságban intenzíven művelt agrárterület egyik dűlőútját kísérő, kb. 40 éve, két sorban, 1 km hosszan ültetett ezüst juhar (*Acer saccharicum*) fasorban 2012. július 7-én az említett faj egy imágó példányát észleltük, amely igen nagy valószínűséggel a szóban forgó fák – amelyek között már az odvasodó, korhadó példányok sem hiányoznak – egyikében nevelkedhetett.

Endes Mihály, Sáfrány Margit

A FEHÉRPETTYES ÁLCSÜNGŐ (*SYNTOMIS PHEGEA*) ELTÉRŐ SZÍNEZETŰ PÉLDÁNYAI. A debreceni Nagyerdőben, 1999. június 26-án észlelt példányokon látható a szárnyakon levő foltok elhalványodása, a potrohon pedig a gyűrűvesztés. A legsötétebb az aberratio bimaculata elnevezést viseli (alul) (lásd fotó).

Szabó Sándor



Fehérpettyes álcsüngő színezetei (Fotó: Kozma P.)
Colour forms of *Syntomis phegea* moth (Photo: P. Kozma)

GYAPJASLEPKE (*LYMANTRIA DISPAR*) MEGFIGYELÉSE A BARTÓK BÉLA ÚTON, DEBRECENBEN. A helyi védelem alatt álló fasor egyik egyedén figyeltem meg 2009. júliusában a kifejlett imágót, illetve annak bábját, petecsomóját. A gyalogátkelő közelében álló tölgy törzsének nyugati oldalán található repedésben (fagyléc) kb. 120 cm magasságban helyezkedett el a lepke, illetve a bebábozódott alak. A gyapjaslepke őshonos, polifág faj, tápnövényeinek száma a több százat is eléri. Ebben az esetben külön érdekesség, hogy a fa törzsén a báb, az imágó és a petecsomó is megfigyelhető volt (lásd fotó).

Varga József