

Gyapjaslepke fejlődési stádiumai (Fotó: Varga J.)
Developmental stages of *Lymantria dispar* moth (Photo: J. Varga)

NAGY SZIKIBAGOLYLEPKE (*GORTYNA BORELII LUNATA*) DEBRECEN KÜLVÁROSI RÉSZÉN. 2009. október 25-én egy nőstény példányt észleltem a METRO áruház melletti parkolóban, a járdán, a reggeli órákban, nagy fényerejű lámpatest alatt. Több más, szintén csak ősszel rajzó faj fordult elő (*Conistra, Agrochola, Erannis*) még a területen. Korábbi évekből származó adatok: 1955-ben Dr. Varga Zoltán három példányt észlelt az Egyetem-téren, lámpatestek alatt; 1993-ban a Calandrella VII/1-2. számában a 148. oldalon közöltük, hogy egy példány a Pallagi út és a Nagyerdei körút sarkán álló higanygőz izzóval üzemelő lámpaoszlopon ült. Ezek az előfordulások azt valószínűsítik, hogy egyrészt igen vagilis fajról van szó, másrészt létezhetnek Debrecen környékén megmaradt tenyészőhelyei ennek az erősen tápnövényspecialista, sziki kocsordon élő (*Peucedanum officinale*) bagolylepkének. Ennek a védett fajnak Magyarországon él Európában a legnagyobb és egyben legerősebb állománya.

Szabó Sándor