RÉTISAS (*HALIAEETUS ALBICILLA*) UNIKÁLISAN KISMÉRETŰ TOJÁSA. A faj irodalmi források alapján ismert, nagyszámú példány alapján megállapított minimális tojásméretei Makatsch, W. szerint (265 db, Die Eier der Vögel Europas, 1.: 171-172., Neumann, Radebeul): hossz 67,5 mm, szélesség 53,4 mm, míg Schönwetternél (150 db, Meise, W. 1961. Handbuch der Oologie, 3.: 173., Akademie, Berlin): ugyanez 66,0 mm, illetve 53,0 mm. A Hortobágyi Vadasparkban, műfészekben költő (2008. március) idős pár terméketlen, 3 csaknem azonos méretű közül egyetlen megmaradó tojásának megfelelő méretei viszont 53,5x44,4 mm, amely értékek messze alatta maradnak az eddig ismerteknek. A példány lemérésének lehetőségét ezúton köszönöm meg Dudás Miklósnak.

Endes Mihály

HÉJA (*ACCIPITER GENTILIS*) TÉLI MEGJELENÉSE NAGYVÁROSI PARKBAN. Debrecenben, a Vezér utcai 3-4 szintes házsorokból álló lakótelep kb. 1,5 hektáros, zömmel fiatal fák csoportjaiból álló parkjában 2012. február 9-én egy termetes tojó héja csapott a kopár ágak között tevékenykedő rigó-cinege- és pintyfélék közé. Az énekesek nem repültek el, hanem mozdulatlanná dermedten ülve maradtak a gallyakon, s kb. 1,5 m-re tőlük a ragadozó ugyanezt tette, tekintetét rájuk szegezve, majd mintegy 2 perc elteltével tovaszállt.

Endes Mihály

KERECSENSÓLYOM (*FALCO CHERRUG*) PORFÜRDŐZÉSE SZIKESPUSZTÁN. Derecske városától DK-re, a Nagy-nyomás nevű, 90 hektáros szikesedő löszhátas pusztagyepen jelent meg kb. 1 km távolságban lévő, 50-60 éves tölgy-kőris-szil ligeterdőben évek óta fészkelő pár tojó példánya 2012. június 30-án, délután 16 óra tájban, az erős ürgeállományú rendszeres vadászterületén. Kb. 70-80 m magasságban történő rövid körözés után ereszkedett le a talajra, egy keskeny, poros dűlőútra, s egy 30 cm átmérőjű laza poros mélyedésbe kuporodott, majd intenzív mozgással, 3-4 percig tartó porfürdőzésbe kezdett. Ezt követően felállva megrázta tollazatát és elrepült. Vadászni ez alkalommal nem láttuk.

Endes Mihály, Serestyén Zsolt, Sáfrány Margit

HAVASI LILE (*CHARADRIUS MORINELLUS*) VONULÁSA SZÁNTÓFÖLDÖN. Újfehértó (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) szélén, a Maszling elnevezésű, hullámos felszínű, homokos lösztalajú, intenzíven művelt agrárterület egy kopár szántásán (amely a magyar szikipacsirta (*Calandrella brachydactyla hungarica*) egyetlen, még ismert költőhelye), 5 példányos csapatát észleltük 2012. április 13-án. Haraszthy (szerk. 1998: Magyarország madarai), valamint Hadarics et Zalai (Magyarország madarainak névjegyzéke 2008.) szerint alkalmilag ehhez hasonló biotópokban is megjelenik, tavasszal jóval ritkább előfordulása, azonban Endes et Gergely 2005. április 2-án Görbeházán kb. 100-as csapatát látta (Calandrella, 2010., XIII.: 207.).

Endes Mihály, Dudás Miklós, Katona József