KOTLÓ TÖVISSZÚRÓ GÉBICS (*LANIUS COLLURIO*) HÍM. Tizenkilenc évvel ezelőtt (1993-ban) sikerült megfigyelni 2 esetben kotló hímeket. Gadnán (Cserehát) 3, illetve Sajóbábonyban (Tardonai-dombság) 4 tojáson kotlott a hím. Mindkét esetben még nem voltak teljesek a fészekaljak. Az idén 2012-ben Győr-Likócs, likócspusztai részén próbáltam t. gébics fészket keresni. 06. 04.-én vadrózsán, 1,7 m magasan találtam egy 3 tojásos fészekaljat, amin a hím kotlott. Akkor még azt hittem, hogy nem teljes a fészekalj, ezért hasonló volt az eset az 1993-assal. A minél kevesebb zavarás érdekében csak 06. 14.-én ellenőriztem újra a fészket, ekkor a tojó ülte. A fészekben 3 fióka volt 1, 2, és 3 naposak lehettek. Legközelebb 06. 17.-én ellenőriztem újra, ekkor megint a hím ülte a fészket, a fiókák 4, 5 és 6 naposak lehettek. Július második felében 2 fiatalt visszafogtam a fészekaljból, tehát feltehetően sikeresen kirepültek. A területen 2011-ben az év első felében elég nagy szárazság volt, a 3 fiókás fészekalj feltehetően ennek az eredménye. De az is valószínűsíthető, hogy a kisebb, 3-4 tojásos fészekaljaknál gyakrabban kotlanak a hímek és melegítik a fiókákat a fészekben tartózkodásuk alatt.

Vizslán Tibor

SZARKA (*PICA PICA*) DENEVÉRVADÁSZATON. Debrecenben, városszéli lakótelep panelházainak a falelemei közötti mesterséges hézagokban (úgynevezett fugák) több ponton denevérek telepedtek meg. Először a közönséges késeidenevér (*Eptesicus serotinus*), majd ezeket kiszorítva az eredetileg erdei, illetve odúlakó rőt koraidenevér (*Nyctalus noctula*). Az utóbbi években a szóban forgó réseket a legtöbb helyen lezárták, eltömítették, így a denevérek zöme eltűnt, s csak kevés példány mutatkozik itt-ott átnyaralni, szaporítani, vagy telelni. Ezeknek az ablakkeretek tokjai és redőnyszekrények illesztései jelenthetnek otthont, noha sehol sem fogadják szívesen őket az emberek. 2012. december 2-án, délelőtti napszakban észleltem egy, e téren már láthatóan rutinossá vált szarkát, amely szisztematikusan, ablakról ablakra repkedve, kapaszkodva, lebegve igyekezett az említett réseket megközelíteni, majd erőteljes csőrvágásokkal szondázni azokat, láthatóan zsákmányt keresve. Minthogy nem járt sikerrel, egy negyedóra elteltével továbbállt.

Endes Mihály

DOLMÁNYOS VARJÚ (*CORVUS CORONE CORNIX*) MINT KUTYATÁP FOGYASZTÓ. 2012. március végétől szinte máig, eleinte a tavaszi időszakban egy pár, később július végétől egy 4 példánnyal kibővült varjúcsapat naponta rendszeresen meglátogatta a Nagyerdő széle és a Nagyerdei körút közötti kerteket, táplálkozás céljából. Eleinte nagyon óvatosak voltak, letelepedtek a TV-antennákra, háztetőkre, onnan figyelték a kutyák etetését. Később egyre merészebben táplálkoztak a kutyatápból. A száraz granulátumokon kívül a nagyobb méretű táprészek sem jelentettek gondot számukra. Ott helyben vizet is ittak, csőrüket gondosan megtörölve távoztak. A táplálkozó dolmányos varjak kis csapata kibővült igen népes és hangos házi verebekkel (*Passer domesticus*) valamint mezei verebekkel (*Passer montanus*) és egy balkáni gerle párral (*Streptopelia decaocto*). Ezek a fajok is fogyasztottak a kirakott tápból, de inkább a konyhai hulladék (kenyérhéj, ételmaradék) szerepelt az étlapjukon. A nem messze található Kultúrparkban szintén ezek a fajok szerepelnek mint hívatlan vendégek etetéskor és azt követő időszakban.

Szabó Sándor