„MONOFÁG" LEPKEEGYÜTTES A DÉL–HAJDÚSÁGBAN. Mikepércs mellett, a Cserepes-dűlőn 2013. június 22-én, napos, 30°C feletti hőmérsékletű időjárásban löszön (csernozjom) művelt kapáskultúrák között fekvő nedves mélyedésben (*Alopecurus pratensis* és *Bolboschoenus maritimus* mocsárrét-mocsár mozaikok) 200 m^2-es tiszta állományú, teljes virágzásban lévő, nektárdús kisfészkű aszat (*Cirsium brachycephalum*) foltban több más rovarcsoport: legyek, méhek, dongók mellett hét nappali lepkefaj táplálkozott. Közöttük egy-egy példányban fordult elő a fecskefarkúlepke (*Papilio machaon*), káposztalepke (*Pieris brassicae*), rezedalepke (*Pontia daplidice*), sáfránylepke (*Colias crocea*), nagy ökörszemlepke (*Maniola jurtina*), továbbá hét sakktáblalepke (*Melanargia galathea*), valamint harmincöt nappali pávaszem (*Nymphalis io*), összesen 62 példány. Megjegyezzük, hogy ebben az időpontban más virágzó növénynek (*Consolida, Papaver, Vicia, Anthemis* fajok) csupán elszórtan, néhány példánya volt található.

Endes Mihály, Sáfrány Margit

ÓRIÁS KERESZTESPÓK (*ARANEUS GROSSUS*) GÖMÖRSZŐLŐSÖN. A település határában magaskórós növényzetben 2010. 07. 26.-án két példányát láttam. Ugyancsak ez a faj fordult elő egy példányban a Teresztenyei–fennsíkon 2012. 06. 20.-án.

Szabó Sándor

SZONGÁRIAI CSELŐPÓK (*LYCOSA SINGORIENSIS*) ELŐFORDULÁSA DEBRECENBEN. Az Egyetem Botanikus Kertjében 2010. október 25.-én egy példány volt észlelhető a bejáratnál. A pók jól kiépített aknájából bújt elő, amit a dézsás növények beszállításakor megbolygattak. A pókot a közeli járművek veszélye miatt egy nyíltabb, füvesebb helyre telepítették át. Néhány órával később néhány métert megtéve a TEK épület oldalfalán volt megfigyelhető. A Debreceni Egyetem környékén korábbi években is megfigyelhető volt ez a faj. Élőhelye visszaszorult a sportpályák építése miatt. (Szerkesztői megjegyzés: A DEAC edzőpályán nem ez a faj élt, hanem a *Lycosa vultuosa*, a pokoli cselőpók – Varga Z.)

Szabó Sándor

KOI PONTY (*CYPRINUS CARPIO KOI*) A TÓCÓ-PATAK DEBRECENI SZAKASZÁN. A Hajdúhát és a Nyírség választóvonalát szinte kijelölő folyásnak mélységi forrásai nincsenek, ugyanakkor az ezt helyettesítő talajvíz és a csapadék, bármilyen időjárású év is legyen, nem akadályozza meg, hogy időnként, akár hetekre, sőt hónapokra teljes hosszában (Debrecen déli széléig, ahol antropogén vízgyűjtőként is szerepel, s lejjebb folyamatosan vizet szállítóvá válik) kiszáradjon. Emellett a várostól északra, Józsa településrész alatt „magán-gát" is található(!), és hasonlóan hozzá egy városi túlfolyó bukógát az Úrrétje régióban. E leghosszabb szakaszán tehát kizárólag a csapadék szabja meg a mennyiséget (és minőséget), valamint a szezonális időszakot (évszakot). A halfauna szegényesnek mutatkozik (lásd Endes: A Tócó-patak völgyének gerinces faunája. In Orosz, T.: A Tócó-völgy környezeti állapota… etc.: 136.): Razbóra (*Pseudorasbora parva*), ezüstkárász (*Carassius gibelio*), utóbbiak ivadék behelyezéséről is tudunk. Védett faj a