száraz (aszályos évek!) *Agrostio stoloniferae – Alopecuretum pratensis*, ill. *Bolboschoenetum maritimi*. A közelben tanyák nincsenek, egy kisebb juhászat kb. 4 km-re, kertje nincs. Ha lehettek is természetes löszgyepek, ligeterdő foltok, azok nagy valószínűséggel nem évtizedek, hanem már évszázadokkal ezelőtt nyomtalanul eltűntek. A nőszirom hajtások (egyenként 2-3) két polikormonból származnak, rajtuk egy-egy virág mellett 4-5 bimbó. Lokalizációjuk egy kb. 8 m átmérőjű, feltehetően második világháborús bombatölcsér széle, előző évi, ritka növésű *Dipsacus laciniatus* kóró-állomány között. A hazai szakirodalom termőhelyül homoki és sztyepréteket is felsorol, s az alföldi előfordulást ritkának tartja (lásd fotók!).

Endes Mihály, Sáfrány Margit



Tarka nőszirom (*Iris variegata*) és termőhelye Szepesen (Fotók: Endes M.)

ADATOK GYŐR-LIKÓCS SZITAKÖTŐ (*ODONATA*) FAUNÁJÁHOZ. A terület Győr-Likócs Likócspusztán található, a Mosoni-Duna árterületéhez tartozik, az UTM kódja (YN08A1). 2013 júniusában a vizsgált területen hatalmas árvíz volt, néhány napig a legmagasabb pontján is több mint 2 m-es víz állt. Az ezután megmaradt vizek csalhatták ide az alábbi két viszonylag ritkább szitakötőt, amiket az eddigi vizsgálódásaim során nem találtam. Az első a mocsári szitakötő (Libellula fulva, Müller,1764) nem sokkal az áradás levonulása után 2013.06.20.-án találtam, egy nőstény példányt. Tenyészőhelyein is viszonylag kis egyedszámban szokott előfordulni. A másik faj a lassú szitakötő (Sympetrum depressiusculum, Sélys-Longchamps, 1841) 2013.07.07.-én 3 példányt, 2 hímet és 1 nőstényt fogtam, a határozás (a potrohán lévő ékszerű mintázat) után elengedtem és még napokig a területen repültek, illetve feltehetően petét is raktak. Mindkét faj Magyarországon védett, eszmei értéke:5000 Ft.

Vizslán Tibor

MEZEI TÜCSÖK (*GRYLLUS CAMPESTRIS*) GRADÁCIÓJA. Derecske várostól K-re, szikes-löszös talajok nyílt, mozaikos felületein 2014-ben többfelé lehetett észlelni e rovar, illetőleg aknáinak feltűnően nagy számát. Előnyben részesítették a lazább, porhanyóbb talajokat, s ilyen részleteken akár néhány m2-en 10-15 példány is megtelepedett, olykor 10-20 cm-re egymástól szinte (?) telepesen ásva meg otthonukat. A környék madárvilága

észlelte a jelenséget és élt is a lehetősséggel. Hasonló jelenséget az elmúlt 12 év során nem észleltünk.

Endes Mihály, Sáfrány Margit



Mezei tücsök (*Gryllus campestris*) gradációja Derecskén (Fotó: Endes M.)

MÁJUSI CSEREBOGÁR (*MELOLONTHA MELOLONTHA*) TÉLI ELŐFORDULÁSA. 2015.01.22.-én járdán eltaposott példányát észleltem a Debreceni Egyetem Élettudományi épületének keleti szárnyán. Valószínűleg a talajban levő fűtőcsövek keltette meleg és a kinti enyhe időjárás késztette ennek a nőstény példánynak a felszínre jövetelét. Ilyen korai adata a debreceni Nagyerdőn eddig nem volt ismert. Rendellenes adatai inkább az őszi időszakból voltak ismertek.

Szabó Sándor

AMERIKAI DARÁZSCINCÉR (*NEOCLYTUS ACUMINATUS*, FABRICIUS, 1775) ELŐFORDULÁS DEBRECENBEN. 2012. május 11.-én Debrecen belvárosi parkjában egy példány amerikai darázscincért (Neoclytus acuminatus) észleltünk. Ez az idegenhonos, polifág faj észak-amerikai eredetű és faanyaggal hurcolták be Európába. Mivel a mediterrán területeken sikeresen megtelepedett, folyamatos terjeszkedése indult be északi irányba. Lárvái lombosfák törzsében, ágaiban fejlődnek, előnyben részesítik a gyümölcsfákat. Magyarországból az első adata 1982-ből, Szeged mellől származik, de az utóbbi években egyre több helyen - így már Hatvan, vagy Budapest környékén is – kimutatták. Debrecenből 2011. május végi adata van a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjéből, ahol virágzó galagonyán figyelték meg, korábban Halápon 2000 júniusában észleltek egy-egy példányt (Szabó S. pers. comm.). Egyelőre tömeges megjelenéséről nincs tudomásunk, csak szórványosan kerül elő.

Koczka András, Papp Gábor