észlelte a jelenséget és élt is a lehetősséggel. Hasonló jelenséget az elmúlt 12 év során nem észleltünk.

Endes Mihály, Sáfrány Margit



Mezei tücsök (*Gryllus campestris*) gradációja Derecskén (Fotó: Endes M.)

MÁJUSI CSEREBOGÁR (*MELOLONTHA MELOLONTHA*) TÉLI ELŐFORDULÁSA. 2015.01.22.-én járdán eltaposott példányát észleltem a Debreceni Egyetem Élettudományi épületének keleti szárnyán. Valószínűleg a talajban levő fűtőcsövek keltette meleg és a kinti enyhe időjárás késztette ennek a nőstény példánynak a felszínre jövetelét. Ilyen korai adata a debreceni Nagyerdőn eddig nem volt ismert. Rendellenes adatai inkább az őszi időszakból voltak ismertek.

Szabó Sándor

AMERIKAI DARÁZSCINCÉR (*NEOCLYTUS ACUMINATUS*, FABRICIUS, 1775) ELŐFORDULÁS DEBRECENBEN. 2012. május 11.-én Debrecen belvárosi parkjában egy példány amerikai darázscincért (Neoclytus acuminatus) észleltünk. Ez az idegenhonos, polifág faj észak-amerikai eredetű és faanyaggal hurcolták be Európába. Mivel a mediterrán területeken sikeresen megtelepedett, folyamatos terjeszkedése indult be északi irányba. Lárvái lombosfák törzsében, ágaiban fejlődnek, előnyben részesítik a gyümölcsfákat. Magyarországból az első adata 1982-ből, Szeged mellől származik, de az utóbbi években egyre több helyen - így már Hatvan, vagy Budapest környékén is – kimutatták. Debrecenből 2011. május végi adata van a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjéből, ahol virágzó galagonyán figyelték meg, korábban Halápon 2000 júniusában észleltek egy-egy példányt (Szabó S. pers. comm.). Egyelőre tömeges megjelenéséről nincs tudomásunk, csak szórványosan kerül elő.

Koczka András, Papp Gábor