GÜZÜEGÉR (*MUS SPICILEGUS*) HORDÁS SZOLONCSÁK SZIKES TALAJON. Debrecentől délre, Szepes területén fedeztünk fel 2013-ban egy sziksós talajú (egykor a Hosszú-szék elnevezésű szódás tavak részleteként – lásd Endes, M. Calandrella, 2013., XVI.: 115-124.) másfél hektáros, keskeny téglalap alakú területet, tavasszal sekély vízfoltokkal, több ár (10x10m) terjedelmű szóda „kivirágzásokkal". Ekkor mindössze 2-3 közönség vakond (*Talpa europaea*) túrása és 3-4 mezei pocok (*Microtus arvalis*) aknájának nyílása volt megfigyelhető. 2014-ben száraz tél, illetve tavasz volt és következett, így jóval több pocoklyuk mellett két güzühordás is megjelent. Ezek az építmények már messziről feltűntek: a kopár világoszürke szoloncsáktalaj anyaguk révén, illetve az elhervadt, leroskadt és megbarnult vegetáció kontrasztjaként. Alakjuk, méreteik a fajra jellemzően megszokott méretekkel egyezett, sima, keményre „cementálódott", kopogósra keményedett külső felszínűk viszont meglepő volt. Kijárónyilás nem látszott, szétbontva már lakatlannak bizonyultak, csaknem színültig tömve az ottani vegetáció magtermésével. A rágcsáló kisemlősök nagy valószínűséggel a közvetlenül szomszédos agrárterületekről húzódtak ide.

Endes Mihály, Sáfrány Margit



Güzüegér (*Mus spicileggus*) hordás és tartalom a szepesi szoloncsákon (Fotó: Endes M.)

VÁNDORPATKÁNY (*RATTUS NORVEGICUS*) MADÁR ELLENI TÁMADÁSA. Egy példány támadt délelőtti órákban költési időszakban a játszótéren éppen ott szedegető fekete rigóra (*Turdus merula*). 2014. május 24.-én történt az eset Debrecenben, az Erzsébet utcán. A játszótéri hinta alatt lévő lyukból kijövő patkány célirányosan a földön éppen ott táplálékot kereső tojó példányra rontott és el akarta kapni. A rigó riasztó hangon felrepült és eltűnt a bokrok között. A patkány a rigó által felkapált földön szimatolt, keresgélt majd a járókelők közeledtére visszafutott a lyukba. Ezen a környéken ebben az időszakban több alkalommal lehetett még nappal is patkányt látni, jelezve a meglévő túlszaporodott állományt.

Szabó Sándor