Az emlősfajok faunisztikai adatai

Közönséges vizicickány (Neomys fodiens).
Újabb lelőhelyei: Imola, Ragály, Zádorfalva (mindenhonnan Tyto köpetekből).

Miller vizicickány (Neomys anomalus milleri). Szintén Tyto köpetekből került elő, újabb lelőhelyei:Alsószuha, Gömörszőlős és Szuhafő.

Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros).
Újabb adatai: Dövényben a régi malom épületében 30 példányos szaporodási közössége él, átnyaralókat még többfelé megfigyeltünk, így Dövény homokbánya, Ragály kastély pincéje és padlása, valamint ravatalozó, Teresztenye és Trizs templomok.

! Nagy patkósdenevér (Rhinoplophus ferrumequinum).
1992. ill. 1993. augusztusában figyeltük meg a trizsi templom padlásán, ill. Rudabányán, a volt dúsító épületében.

! Közönséges denevér (Myotis myotis).
1988-ban gyűjtött egy múmiát ifj. Boldogh S. a felsőnyárádi rk. templomban (det. Szentgyörgyi P.)

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus).
ifj. Boldogh S. Sajógalgócon 1988-ban egyetlen Tyto köpetet gyűjtött, ebből 3 pd. maradványa került elő.

! Törpe denevér (Pipistrellus pipistrellus).
VÁSÁRHELYI (1964.) Putnokról említi, ifj. Boldogh S. a rudabányai rk. templomban gyűjtötte 1988-ban egy múmiáját. (det. Szentgyörgyi P.) Feltehetően ezt a fajt észleltük még erdők szélén Felsőnyárád és Rudabánya környékén.

! Északi denevér (Eptesicus nilssoni).
Rudabányáról Strix aluco köpetből került elő 1 - valószínűleg telelő - példány maradványa.

!Hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi).
VÁSÁRHELYI (1964.) Putnokról említi, mi Rudabányán találtuk 2 példány maradványát Strix aluco köpetben.

! Erdei pele (Dryomys nitedula).
1992. augusztusban Felsőnyárád és Sajókaza között, az út mellett találtuk egy elhullott példányát.

Nagy pele (Glis glis).
VÁSÁRHELYI (1964.) által említett lelőhelyek Putnok, Ragály, Trizs, Sajókaza, Kelemér. Szőlősardóról Strix aluco köpetből 9 példány maradványa került elő, megfigyeltük még erdőben többfelé és a teresztenyei templomban is.

Vízi pocok (Arvicola terrestris).
Újabb lelőhelye: Kelemér (Tyto köpetből).

Földi pocok (Pityms subterraneus).
Újabb lelőhelye: Szőlősardó (Strix aluco köpetből).

! **Farkas** (Canis lupus).
Az 1960-as években Gömörszőlős környékén ejtettek el egy példányt (K. M., 1982.), 1984-85-ben pedig Égerszög környékén figyelték meg.

! **Barna medve** (Ursus arctos).
Kelemér és Serényfalva között 1 példányát 1986-ban megsebezték (LEHOTAY, 1986.).

! **Vidra** (Lutra lutra).
VÁSÁRHELYI (1964.) Kelemérről említi, hiteles megfigyelők szerint az 1980-as évek elején Szőlősardó mellett a Rét-pataknál előfordult.

! **Nyuszt** (Martes martes).
Horváth R. Kánó mellett (Nagyvölgy-Bakrét) figyelte meg, erdőkben mi is többfelé megtaláltuk, így: Dövény környékén, Felsőnyárád Nyárádi-oldalon, Felsőkelecsény Nagy-hegyen.

! **Hermelin** (Mustea erminea).
VÁSÁRHELYI (1964.) Putnokról és Kelemérről említi, mi a Csörgős-patak mellett figyeltük meg, Felsőnyárád határában.

Menyét (Mustela nivalis).
A nyugati részen többfelé előfordul, Keleméren Tyto köpetben is megtaláltuk.

! **Hiúz** (Lynx lynx).
Szuhafő mellett Andó Gy. figyelte meg, egy másik példányt pedig putnoki vadászok ejtettek el az alsószuhai Kőpatak nevű területen.

Végezetül szeretnénk köszönetünket kifejezni Dr. Endes Mihálynak, aki a bagolyköpetekből előkerült Neomys és Apodemus fajok határozását revideálta ill. elvégezte, ifj. Boldogh Sándornak, aki gyűjtött köpeteit és denevér múmiáit hozzánk meghatározásra eljuttatta, valamint Horváth Róbertnek és Andó Gyulának, akik publikálatlan adataikat ill. megfigyeléseiket rendelkezésünkre bocsájtották.

IRODALOM

FÜGEDI, L., SZENTGYÖRGYI, P. 1992. A Borsodi-dombság keleti és középső részének emlős (Mammalia) faunája. Calandrella, VI/1: 49-62.

K. M. 1982. Borsodi kártevők. Nimród, 102/5: 198-199.

LEHOTAY, H. Gy. (Tay) 1986. Medvekaland a Mohos-tavaknál. Búvár, 41.,(8: 33

MAROSI, S. , SOMOGYI, S, (szerk.) 1990. Magyarország kistájainak katasztere, II.: 954-958. MTA Földrajztud. Kut. Int., Budapest

VÁSÁRHELYI, i. 1964. Borsod-Abauj-Zemplén megye gerinces faunája. Kézirat.